# SET FARMACI

## FARMACI INDICATI PER LE EMERGENZE NELL'AMBULATORIO MEDICO/ODONTOIATRICO

| Molecola | Nome comm.le | Confezione | Quantità | Indicazioni |
|---|---|---|---|---|
| ADRENALINA* | Adrenalina | fl 1 mg | 10 fl | ACCI, Edema glottide, Anafilassi, Asma bronch. |
| ADRENALINA | Fastjekt | fl 0,33 mg | 1 fl | Edema glottide, Anafilassi, Asma bronchiale |
| | Fastjekt Junior | fl 0,165 mg | | |
| SALBUTAMOLO | Broncovaleas sol. | flac 8 gtt = 2 mg | 1 conf | Asma bronchiale, BOCr |
| | Ventolin 100 | fl ev 100 µg | 2 fl | |
| | Ventolin 500 | fl ev 500 µg | | |
| BECLOMETASONE | Clenil A | flac aerosol | 5 fl | Asma bronchiale, Edema glottide |
| BETAMETASONE | Bentelan | cpr 0,5 mg | 1 conf | Reazioni anafilattiche minori |
| | | fl 4 mg | 3 fl | |
| METILPREDNISOLONE | Solu-Medrol | flac 125 mg | 4 flac | Asma bronchiale, BOCr, Edema glottide |
| | | flac 0,5 g | 2 flac | |
| | | flac 1 g | | |
| CLOBETASOLO | Clobesol | pom 0,05 g | 1 conf | Reazioni allergiche locali |
| CLORFENAMINA | Trimetron | fl 10 mg | 2 fl | Edema glottide, Shock anafilattico, Orticaria |
| CETIRIZINA | Zirtec | cpr 10 mg | 1 conf | Reazioni anafilattiche minori |
| | | qtt mg/ml | | |
| ISOSORBIDE DINITRATO | Carvasin | cpr sl 5 mg | 1 conf | IMA-EPAc |
| NITROGLICERINA | Trinitrina | cpr sl 0,3mg | 1 conf | IMA-EPAc |
| FUROSEMIDE | Lasix | fl 20 mg | 5 fl | EPAc, Crisi ipertensiva |
| MIDODRINA | Gutron | gtt 2,5 mg/ml | 1 conf | Ipotensione vagaler |
| LORAZEPAM | Tavor expidet | cpr sl 1 mg | 1 conf | Crisi d'ansia, attacco di panico, Fobia |
| BROMAZEPAM | Lexotan | gtt 2,5 mg/ml | 1 conf | Crisi d'ansia, attacco di panico, Fobia |
| NALOXONE | Narcan | fl 0,4 mg | 3 fl | Intossicazione acuta da oppiacei |
| GLUCOSIO | Glucosio | fl 10 cc 33% | 10 fl | Ipoglicemia |
| GLUCAGONE | Glucagen | fl 1 mg | 1 fl | Ipoglicemia |
| AC. ACETILSALICILICO | Aspirina 0,3 | cpr325 mg | 1 conf | IMA |
| TRAMADOLO | Contramal | cps 100 mg | 1 conf | Analgesia |
| DOMPERIDONE | Motilium | cpr 10 mg | 1 conf | Nausea - Vomito, Crisi vagale prolungata |
| CLORURO-SODIO 0,9% | Fisiologica | Sacche 250 cc | 2 sacche | Somm.ne farmaci in infusione e in piccoli boli. Diluizione farmaci per aereo-sol. Diluizione adrenalina nel bambino. riempimento in ipovolemia (shock anafilattico edemorragico).Mantenimento diunaccesso venoso. |
| RINGER LATTATO | Ringer lattato | Sacche 500 cc | 1 sacca | Riempimento in ipovolemia (shock anafilattico e shock emorragico) |